

# Грипп

Главный внештатный специалист  
Комитета здравоохранения  
Волгоградской области,  
главный врач ГБУЗ «ВОИБ № 2»  
Е.А. Хлопотова

# СТАНДАРТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЯ ФОРМ ОРИ

(Руководство Европейского регионального бюро ВОЗ по дозорному эпиднадзору за гриппом среди людей  
(2011))


## **Определение случая ОРИ.**

Диагноз ОРИ ставится при остром развитии по крайней мере одного из следующих четырех симптомов респираторного заболевания: кашель; боль в горле (фарингит); одышка; острый насморк. А также на основании клинического заключения о том, что заболевание обусловлено инфекцией.

## **Определение случая «гриппоподобного заболевания»**

Внезапное появление симптомов заболевания, наличие, по крайней мере, одного из перечисленных четырех системных проявлений: **лихорадка (температура тела  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) или озноб, недомогание, головная боль, миалгия,** наличие, по крайней мере, одного из перечисленных трех **респираторных симптомов:** кашель, боль в горле, одышка.

**Диагноз ТОРИ (Тяжелая острая респираторная инфекция)** ставится в случае заболевания, возникшего в течение предшествующих 7 дней, потребовавшего госпитализации и характеризующегося следующими проявлениями: лихорадка  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  – по результатам измерения или в анамнезе, *а также* кашель, *а также* одышка или затрудненное дыхание.



**Грипп** (*франц. grippe*), *инфлуэнца* — острая высококонтагиозная респираторная вирусная инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа типа А, В и С.

Подтвержденным случаем гриппа считается случай, при котором у пациента имеет место острое респираторное заболевание и положительные результаты лабораторной диагностики.

# Классификация

Клиническая классификация гриппа

**По течению:**

1. Типичное (манифестное);
2. Атипичное (бессимптомное, стертое);

**По тяжести :**

1. Легкая степень тяжести;
2. Средняя степень тяжести;
3. Тяжелая степень тяжести;
4. Очень тяжелая степень тяжести (гипертоксическая);

**По характеру течения:**

1. Неосложненное;
2. Осложненное;
3. Специфические осложнения (вирус-ассоциированные);
4. Неспецифические осложнения:
5. Бактериальные осложнения;
6. Обострение/декомпенсация хронических заболеваний.

Клинические формы заболевания разделяются по преобладанию определенных симптомов и тяжести их проявлений.

### По течению:

1. Типичное (манифестное);
2. Атипичное (бессимптомное, стертое);

### К типичным формам относятся:

Катаральная	Токсическая	Субтоксическая	Токсико-катаральная
катаральные явления значительно выражены;	высокая температура;	Характерны те же проявления, как и для токсической, но с умеренной выраженностью	Присутствуют признаки и токсической, и катаральной форм.
существенные интоксикационные проявления практически отсутствуют	общее состояние резко нарушено; нарушаются работа сердечно-сосудистой и нервной систем		

## К атипичным формам относятся:

<b>Стертая форма</b>	Протекает легко, при отсутствии интоксикации и существенной выраженности клинических проявлений: <ul style="list-style-type: none"><li>•без лихорадки (афебрильная);</li><li>•без насморка, кашля, иных катаральных симптомов (акатаральная).</li></ul>
<b>Молниеносная (гипертоxическая), без развития геморрагической пневмонии</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•бурное начало;</li><li>•изредка возможны (или отсутствуют) проявления катара верхних дыхательных путей (фарингита, ринита и др.);</li><li>•мучительная головная боль;</li><li>•высокая температура – до 40 градусов и выше ( в некоторых случаях может отмечаться низкая температура);</li><li>•резкая адинамия и гипотония; потеря сознания;</li><li>•глухие тоны сердца; слабый частый пульс;</li><li>•рвота; судороги (у детей); бред; цианоз;</li><li>•одышка; менингеальные проявления;</li><li>•интоксикация вплоть до коматозного состояния;</li><li>•угнетение сердечно-сосудистой деятельности (коллапс);геморрагический синдром; поражения нервной системы;</li><li><b>•летальный исход спустя 10 часов – 2-е суток;</b></li><li>•встречается редко, преимущественно во время пандемий, значительных эпидемий;</li></ul>

## К атипичным формам относятся:

Молниеносная форма с развитием геморрагической пневмонии («испанка» патологоанатомов, «легочная» форма, «пневмогрипп»)

развитием пневмонии в первые же дни болезни; формированием геморрагических очагов поражения легких, сопровождающихся выделением кровянисто-слизистой мокроты; резкой интоксикацией; одышкой; цианозом; тахикардией;  
**быстрым наступлением летального исхода.**  
Присутствуют и признаки, характерные для формы молниеносного течения без развития геморрагической пневмонии

# Классификация

Клиническая классификация  
гриппа

## По тяжести :

1. Легкая степень тяжести;
2. Средняя степень тяжести;
3. Тяжелая степень;
4. Очень тяжелая степень тяжести  
(гипертоксическая);



## По тяжести :

Признак	Характеристика признака			
	Легкая степень тяжести	Средняя степень тяжести	Тяжелая степень тяжести	Очень тяжелая степень
Длительность заболевания	<b>2-4 дня</b>	<b>4-5 дней</b>	<b>более 5 суток</b>	<b>Молниеносное текущее</b>
Лихорадка, проявления интоксикации	Лихорадка до 38,0 <sub>о</sub> С	Лихорадка до 38,0- 40 <sub>о</sub> С	Лихорадка до 40 <sub>о</sub> С и выше.	Лихорадка выше 40 <sub>о</sub> С.
Пульс и систолическое артериальное давление (САД) *	Пульс - менее 90 уд/мин. САД - 110 мм рт. ст. и выше	<b>Пульс 90—120 уд/мин. САД менее 110 мм рт. ст.</b>	<b>Пульс более 120 уд/мин, нередко аритмичен. САД менее 90 мм рт. ст. Тоны сердца глухие.</b>	<b>Пульс более 120 уд/мин, нередко аритмичен. САД менее 90 мм рт. ст. Тоны сердца глухие.</b>
SO <sub>2</sub> *	SpO <sub>2</sub> 95-100%	<b>SpO<sub>2</sub> ≤ 95 %</b>	<b>SpO<sub>2</sub> ≤ 90 %</b>	<b>SpO<sub>2</sub> ≤ 88 %</b>
ЧДД *	16-23 в мин.	<b>Более 24 в мин.</b>	<b>Более 28 в мин.</b>	<b>Более 28 в мин.</b>

## Классификация

Клиническая классификация гриппа

### По характеру течения:

1. Неосложненное;
2. Осложненное;
3. Специфические осложнения (вирус-ассоциированные);
4. Неспецифические осложнения;
5. Бактериальные осложнения;
6. **Обострение/декомпенсация хронических заболеваний.**



- **Неосложненный грипп** — заболевание сопровождается лихорадкой, катаральными проявлениями (кашель, заложенность носа, насморк), симптомами общей интоксикации (головная боль, слабость, миалгии, артриты), иногда желудочно-кишечными расстройствами
- **Осложненный грипп** — заболевание сопровождается развитием вирус-ассоциированных и/или бактериальных осложнений с поражением нижних отделов дыхательных путей, центральной нервной системы, и/или обострением сопутствующих хронических заболеваний и/или других состояний, требующих проведения стационарного лечения

## **Осложнения:**

### **Состояния, обусловленные патогенетическим действием вируса гриппа**

Вирусное поражение легких (пневмония);

- Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) ;
- Острая дыхательная недостаточность (ОДН)
- Токсический геморрагический отек легких ;
- Острая циркуляторная недостаточность, инфекционно-токсический шок (ИТШ);
- Инфекционно-токсическая энцефалопатия (ИТЭ) ;
- Отек головного мозга;
- Острая иммуносупрессия (острая иммуносупрессия беременных);
- Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит).



# Осложнения:

## ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ГРИППЕ

Известно, что грипп и ОРВИ часто провоцируют развитие осложнений. Узнайте, на какие возможные осложнения указывают симптомы:



## Вторичные осложнения гриппа

- Вторичная пневмония. Состояние обусловлено присоединением бактериальной или грибковой флоры.
- Септический шок. Состояние обусловлено присоединением бактериальной или грибковой флоры.
- Осложнения со стороны ЛОР органов (гаймориты, отиты, фронтиты, синуситы, тубоотиты, лакунарная и фоликулярная ангиня)
- **Декомпенсация сопутствующих хронических заболеваний (бронхиальная астма, ХОБЛ, хроническая сердечная недостаточность, заболевания печени и почек)**



дети в возрасте  
от 6 месяцев до 4 лет

беременные  
женщины

взрослые  
старше 50 лет

пожилые  
люди



люди, которые в анамнезе  
имеют легочные или  
сердечнососудистые  
заболевания

люди, страдающие  
астмой и диабетом

люди с пониженным  
иммунитетом

## Факторы риска возникновения осложнений :

- Пожилые люди старше 65 лет;
- Беременные;
- Пациенты с бронхиальной астмой и др. хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем (ожирение), метаболическим синдромом, болезнями печени и почек;
- Лица с иммунодефицитами (по причине первичных иммунодефицитов, таких как ВИЧ-инфекция, в связи с вторичными состояниями, такими как прием лекарств, подавляющих иммунитет, или наличие злокачественных образований);
- Взрослые, длительно применяющие аспирин.

## Обследованию на грипп в первый день обращения подлежат:

- беременные на любом сроке беременности;
- пациенты с факторами риска неблагоприятного развития болезни;
- пациенты с пневмониями.



дети в возрасте  
от 6 месяцев до 4 лет



беременные  
женщины



взрослые  
старше 50 лет



пожилые  
люди



люди, которые в анамнезе  
имеют легочные или  
сердечнососудистые  
заболевания



люди, страдающие  
астмой и диабетом



люди с пониженным  
иммунитетом

## **Признаки и симптомы прогрессирования заболевания, свидетельствующие об ухудшении снабжения организма кислородом или сердечно-лёгочной недостаточности:**

- одышка (при движении или в состоянии покоя),
- перiorальный цианоз ,
- боль в груди при дыхании и кашле,
- кровянистая или окрашенная мокрота,
- пониженное кровяное давление.

**Кислородное насыщение крови и частота дыхания - это два наиболее важных клинических параметра, которые требуют мониторинга.**

**Гипоксия, определяемая по показаниям пульсоксиметра (норма SpO<sub>2</sub> 95-100%).**

Признак	Характеристика признака			
	Легкая степень Тяжести	Средняя степень тяжести	Тяжелая степень тяжести	Очень тяжелая степень
SO <sub>2</sub>	SpO <sub>2</sub> 95-100%	SpO <sub>2</sub> ≤ 95 %	SpO <sub>2</sub> ≤ 90 %	SpO <sub>2</sub> ≤ 88 %
ЧДД	16-23 в мин.	Более 24 в мин.	Более 28 в мин.	Более 28 в мин.

**Амбулаторное лечение показано при** легких и среднетяжелых формах гриппа (при отсутствии факторов риска неблагоприятного развития заболевания).

Амбулаторное ведение больных требует проведения регулярного контроля динамики проявлений болезни.

**Кислородное насыщение крови и частота дыхания - это два наиболее важных клинических параметра, которые требуют мониторинга.**

**Госпитализация в инфекционный стационар показана при:**

- сохранении высокой лихорадки более 3 дней или её нарастания,
- появлении признаков прогрессирования заболевания,
- усугубления признаков синдрома интоксикации,
- появление одышки в покое или при физической нагрузке,
- периорального цианоза,
- кровянистой или окрашенной кровью мокроты,
- болей в груди при дыхании и кашле, изменения психического статуса,
- артериальной гипотонии.

**Госпитализации** независимо от сроков заболевания подлежат:

- все беременные с гриппом, независимо от сроков беременности,
- больные ОРВИ с факторами риска неблагоприятного развития болезни,

## Классификация гриппа в соответствии с МКБ-Х

Рубрика	Нозологическая форма
J09.	Грипп, вызванный выявленным вирусом зоонозного или пандемического гриппа вирус <b>гриппа А</b>
J10	Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа грипп, вызванный идентифицированным <b>вирусом гриппа В или С</b>
J10.0	Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован
J10.1	Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа идентифицирован
J10.8	Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифицирован
J11	Грипп, вирус не идентифицирован
J11.0	Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован
J11.1	Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован
J11.8	Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован.

# **ПРАВИЛА КОДИРОВАНИЯ ГРИППА**

**Рубрика J09 «Грипп, вызванный идентифицированным зоонозным или пандемическим вирусом гриппа».**

К этой рубрике относится грипп, вызванный подтипами вируса типа А:

А/H1N1 – сезонный и пандемический (свиной);

А/H3N2;

А/H5N1 – эпидемический (птичий);

А/H7N9

**Грипп, вызванный вирусом типа А кодируется рубрикой J09 независимо от того, какие осложнения гриппа имеются у пациента**

**Рубрика J10 «Грипп, вызванный идентифицированным сезонным вирусом гриппа».**

К рубрике относится грипп, вызванный сезонными вирусами типов В и С

Подрубрики:

**J10.0** Грипп с пневмонией, вызванный сезонным вирусом гриппа.


**J10.1** Грипп с другими респираторными проявлениями, вызванный сезонным вирусом гриппа.

Включены гриппозные: острые инфекции верхних дыхательных путей, ларингит, фарингит, плевральный выпот

**J10.8** Грипп с другими проявлениями, вызванный сезонным вирусом гриппа.

Включены: энцефалопатия, вызванная гриппом, гриппозный гастроэнтерит и миокардит (острый)

**Все случаи гриппа, включенные в рубрики J09 и J10  
должны быть подтверждены лабораторным методом**



## Обоснование и формулировка диагноза

Диагноз ГРИПП ставится:

- только при получении лабораторного подтверждения;
- при наличие контакта с больным, у которого имеется лабораторное подтверждение гриппа.

**При наличии осложнений и сопутствующих заболеваний запись делается отдельной строкой:**

- Сопутствующее заболевание.
- Осложнения.Гриппозная пневмония является осложнением гриппа и в качестве основного состояния **не используется**

## **ПРАВИЛА КОДИРОВАНИЯ ГРИППА**

Если при обращении пациента к врачу выставляется диагноз гриппа, то это состояние кодируется в соответствии с формулировкой диагноза и регистрируется как впервые выявленное заболевание со знаком (+).

Данное состояние является острым, перерегистрации не подлежит, и при повторном обращении так же регистрируется как острое.

**В статистике смертности имеет значение состояние, которое являлось «основным» в последнем эпизоде оказания медицинской помощи.**

**В таких случаях грипп как острое заболевание должно выбираться в качестве первоначальной причины смерти, несмотря на наличие других состояний (травмы, онкологические заболевания, болезнь, вызванная ВИЧ, болезни органов кровообращения, туберкулез и др. заболевания).**

Если при гриппе произошло внезапное воздействие внешней причины (травма, несовместимая с жизнью), то эта травма с внешней причиной выбираются в качестве первоначальных причин смерти, а грипп указывается в части II медицинского свидетельства о смерти (далее –Свидетельство).

Если при гриппе возникло другое острое состояние, не связанное с гриппом, которое безусловно привело к смерти, например, язвенное кровотечение, то это последнее состояние и должно быть выбрано в 3 качестве первоначальной причины смерти, а грипп указывается в части II Свидетельства.

## ПРАВИЛА КОДИРОВАНИЯ ГРИППА

Грипп у беременной, роженицы или родильницы (до 42 дней после родов).

При этом первоначальной причиной смерти выбирается грипп, осложняющий беременность, деторождение и послеродовый период – код О99.5 (состояние из 15-го класса МКБ-10).

Данная причина входит не в показатель смертности от гриппа, а в показатель материнской смертности.

## Лечение легких и среднетяжелых форм гриппа

**Антивирусная терапия является важнейшей составляющей комплексного лечения гриппа**

Лечебная схема	Экстренная профилактика (при контакте с больным гриппом)
Оセルтамивир 75 мг 2 раза/сут. в течение 5 дней (суточная доза 150 мг)	75 мг 1раз/сут. в течение 10 дней
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (Ингавирин) 90 мг 1раз/сут. в течение 5 дней	90 мг 1раз/сут. в течение 7 дней.
Умифеновир ( Арбидол) 200 мг 4 раза/сут. в течение 5-7 дней (суточная доза 800 мг)	200 мг ежедневно в течение 10–14 дней

## **Лечение тяжелых форм гриппа**

**Осельтамивир в дозе 150 мг два раза в сутки,  
Ингавирин ® в дозе 90 мг,**

эффективность оценивается в ближайшие 4-6 часов.

Если в этот период не произошло снижения температуры и уменьшения общих интоксикационных проявлений, то назначается повторная доза препарата.

Т.е. проводится режим индивидуального титрования дозы, таким образом,  
**суточная доза Ингавирина может составить до 3-4 капсул в день.**

Если в течение 24 часов не удалось добиться изменения самочувствия больного, необходимо провести ревизию диагноза и возможно назначение двойной антивирусной терапии:

**Ингавирин ® (180 мг один раз сутки) + Осельтамивир (150–300 мг 2 раза в сутки).\***

(методические рекомендации по диагностике и лечению гриппа, утвержденные Министерством здравоохранения 2016 г.)

## **Организаторам здравоохранения**

1. Донести все сведения о тактике ведения пациента с ОРВИ и гриппом.
2. Заключить договора на обследование на грипп.
3. Обеспечить наличие пульсоксиметров у каждого участкового терапевта ( педиатра) и среднего медицинского персонала.
4. Контролировать правильность оформления первичных вызовов с ОРВИ (выборочно смотреть наличие данных Т,ЧСС,ЧД, SO2).
5. Организовать своевременный и правильный забор материала на грипп, особенно у непривитых и пациентов из группы риска.
6. Контролировать ведение динамического наблюдения за пациентом с гриппом, оставленным на амбулаторном лечении.
7. Организовать и контролировать преемственность между амбулаторным звеном и стационаром.
8. Контролировать ведение динамического наблюдения за пациентом с гриппом в условиях стационара (лист динамического наблюдения Т,ЧСС,ЧД, SO2 по часам).
9. Провести закупку противовирусных препаратов ( в соответствии с клиническими рекомендациями)
10. Разбор каждого случая летального исхода от гриппа.
11. Соблюдение противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях:  
ввести карантин в медицинских организациях,  
ввести «масочный режим»,  
разграничит потоки температурящих и не температурящих.

# ОПРОСНИК для сбора анамнеза у больных с ОРВИ и гриппом

		Вариант ответа	
<b>1.</b>	<b>Жалобы:</b>		
	Интоксикационный синдром	Да	Нет
	Повышение Т до	Да	Нет
	Катарально-респираторный синдром	Да	Нет
	Кашель	Да	Нет
	Першние в горле,	Да	Нет
	боль в груди при дыхании и кашле	Да	Нет
	затруднённое дыхание	Да	Нет
	кровянистая или окрашенная мокрота	Да	Нет
	одышка (при движении или в состоянии покоя)		
	Диспепсический синдром	Да	Нет
	Тошнота	Да	Нет
	Рвота	Да	Нет
	Диарея	Да	Нет
<b>2.</b>	<b>Анамнез заболевания:</b>		
	Дата заболевания (какой день болеет).		
	Когда и куда обращался.		
	Чем лечился дома, до обращения		
<b>3.</b>	<b>Анамнез жизни:</b>		
	Наличие хронических заболеваний ИБС, ГБ, ХОБЛ, сахарный диабет, ХБП, ожирение, беременность	Да	Нет

4.	Эпидемиологический анамнез		
	Наличие вакцинации от гриппа.	Да	Нет
	контакт с лицом, у которого имеется подтвержденное, возможное или подозреваемое заболевание вирусной инфекцией гриппа типа А (H1N1).	Да	Нет
5.	Объективные данные		
	Повышение Т до		
	АД		
	Сатурация кислорода	SpO2 ≤ 95 %	SpO2 ≤ 95 %
	ЧД	Более 24 в мин.	Более 24 в мин.
	Показания для госпитализации		
	Госпитализация независимо от сроков заболевания		
1	беременные на любом сроке беременности		
2	лица с хроническими заболеваниями (ИБС, ГБ, ХОБЛ, ХБП, сахарный диабет, ожирение)		
3	лица в возрасте 65 лет и старше		
4	лица, получавшие аспирин для лечения хронического заболевания		
5	Систолическое АД от 90 мм рт ст и ниже		
6	Сатурация кислорода от 95% и ниже		
7	Нарушение сознания		
	Госпитализация при наличие признаков и симптомов прогрессирования заболевания		

# **Образец оформления карты вызова с ОРВИ**

## **Жалобы.**

- повышение температуры тела (*указать уровень подъёма \_\_\_\_\_*);
- симптомы интоксикации (*озноб, недомогание, ломота в теле, суставах, мышечная, головная боль и т.д.*);
- насморк,
- першение и чувства саднения,
- боли в горле,
- кашель – указать характер (*сухой или влажный*), наличие и характер мокроты,
- при наличии одышки – указать, когда возникает (*в покое, при физической нагрузке*).

**Анамнез.** когда заболел( день) \_\_\_\_\_

с какого (в течение какого) времени ухудшение \_\_\_\_\_

- последовательность появления симптомов/жалоб \_\_\_\_\_
- динамика катаральных симптомов (насморк, кашель, першение за грудиной, боли в горле) \_\_\_\_\_
- когда возникла и характер одышки, кровохарканье \_\_\_\_\_
- при наличии сыпи – время возникновения и динамику высыпаний \_\_\_\_\_
- какие лекарственные препараты принимал больной и с каким эффектом;
- перенесенные заболевания, обращать особое внимание на наличие легочных, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний;

## **Эпиданамнез:**

- контакт с лихорадящими больными и больными с катаральными симптомами;
- выезд в эндемичные регионы в течение 3 недель до начала заболевания, а также выезд в жаркие страны в течение последних 3 лет;

Аллергологический анамнез;

У женщин – гинекологический анамнез.

**Наличие вакцинации от гриппа (дата) !**



**В объективных данных указать:**

- тяжесть состояния;
  - температуру тела на момент осмотра;
  - бледность или гиперемия кожи лица и слизистых оболочек;
  - наличие склерита и конъюнктивита;
  - состояние рогоглотки: гиперемия, гипертрофия миндалин, наличие наложений и энантемы;
  - при наличии сыпи на коже ее характер, локализация, склонность к слиянию, наличие зуда;
  - при наличии – цианоз губ, акроцианоз;
  - размеры лимфатических узлов
  - затруднение носового дыхания, выделения из носа, охриплость голоса;
  - кашель, характер мокроты (слизистая, слизисто-гнойная, кровохарканье);
  - **ЧДД**, одышка (указать характер);
  - характер дыхания, перкуторный звук, хрипы (их характер и локализация) и крепитация;
  - указать **ЧСС, АД** (в том числе привычные цифры АД);
  - уровень сознания, наличие менингеальных симптомов.
  - **провести пульсоксиметрию.**

## **Тактика ведения пациента**

- Амбулаторное лечение.                   Дата посещения на дому.
  - Госпитализация.                         Дата госпитализации.

# Контрольный вопросник ВОЗ для планирования готовности к пандемии грипп

## 3.3 Ведение больного

### 3.3.1 Ведение и лечение больного

**Обоснование** Для обеспечения эффективного и безопасного лечения случаев заболевания гриппом (подозрительных) нового штамма, важно, чтобы были подготовлены клинические руководства, материалы были доступны, а штат владел критериями госпитализации и т.д. Кроме того, штат должен быть осведомлен и обучен мероприятиям по борьбе с инфекций.

#### **Вопросы, требующие ответа**

Каким образом человек заразился?

Следует ли его лечить? Если да, то где и как?

Требуется ли дополнительное лабораторное обследование? Если да, то как нужно брать образцы и, как их транспортировать?

#### **Проверка**

Обеспечьте разработку или быструю адаптацию и внедрение клинического руководства по ведению пациентов с подозреваемым и подтвержденным гриппом, вызванным пандемическим штаммом.

Руководство должно освещать, как минимум, следующие аспекты: – где должны вести больного (в общественном или больничном учреждении),

критерии приема в учреждение;

- правильный сбор образцов, транспортировка образцов в лабораторию и их исследование надлежащим способом;
- терапевтические протоколы, включая антивирусные лекарства, антибиотики и другое поддерживающее лечение (вентиляция легких, понижение температуры).

С целью обеспечения высокого профессионализма и заинтересованности предусмотрите создание клинической рабочей группы в составе экспертов из государственного и частного секторов

Желаю плодотворной  
работы !

Благодарю за  
внимание!

